

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

AUVERGNE ET LIMOUSIN

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative, rue Pélissier

63034 Clermont Ferrand Cedex

☎ (73) 92-42-68



BULLETIN TECHNIQUE
PUBLICATION PERIODIQUE

Edition générale

N°23

Le 28 Juillet 1983

ARBRES FRUITIERS

MINEUSES DES FEUILLES

Des captures importantes ont été enregistrées depuis le 15 Juillet dans la région de SAINT-SANDOUX (Puy-De-Dôme).

Dans les vergers où des dégâts ont été constatés l'année dernière, un traitement est à envisager, dans les prochains jours, contre ces ravageurs.

Utiliser de préférence des produits à base de :
diflubenzuron (DIMILIN) ou de méthomyl (LANNATE).

OIDIUM DU POMMIER

Maintenir la protection dans les vergers présentant des symptômes.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Le deuxième vol a débuté dans la nature.

Compte tenu des conditions climatiques favorables à ce papillon, il y a lieu de prévoir un traitement pendant la période du 2 au 8 Août.

P.2.7.1

DIRECTEUR-GERANT: B. MORIN

N° de série: 324

Numéro d'inscription à
la C.P.P.A.P.: 525 AD

Régie de Recettes de la D.D.A.
C.C.P. Clermont-Ferrand 5 503.17

ABONNEMENT
ANNUEL: 100 F

BETTERAVES

OIDIUM

Les conditions climatiques actuelles sont favorables au développement de cette maladie.

En une dizaine de jours, l'oïdium a nettement évolué.

Intervenir rapidement en utilisant de préférence du soufre micronisé à la dose de 6 400 g de matière active par hectare.

Sont également autorisés :

- RUBIGAN : 1 l/ha
- BAYLETON 25 : 1 kg/ha

Une deuxième intervention est à envisager dans un délai de 15 à 20 jours.

Il faudra alors tenir compte de la Cercosporiose et utiliser un produit plus complet.

CARENCE EN BORE

Des débuts de carence sont observés sur les pétioles des feuilles, dans les parcelles situées en situations séchantes.

Il est conseillé de réaliser un apport foliaire d'une solution boratée.

Afin d'améliorer l'assimilation du produit, il est préférable de traiter le matin.
